

SOMMERSÅNING AF KLØVERGRÆS

I august er jorden varm og når jordfugten er til stede, opnås der en god, hurtig og ensartet fremspiring af kløvergræsblandinger. Hermed sikres grundlaget for en god græsmark de kommende år. Vær opmærksom på regler vedr. omlægning af græsmarker.

Følgende har betydning for at sikre en god etablering:

- Jo før i august des bedre, kløver skal helst sås inden 15. – 20. august
- Fugtighed i jorden er nødvendig for fremspiring
- Hurtig arbejdsgang med pløjning, pakning og såning – gerne i løbet af få timer for at bevare jordens fugtighed
- Udlægget skal sås på fast tromlet jord i ca. 1 cm dybde
- Rillesåning med alm. såmaskine giver ofte bedre resultat end frøsåkasse
- Udsædsmængde af kløvergræs er ca. 30-35 kg/ha (man anbefaler at øge udsædsmængden med 20% i fht. forårssåning i dæksæd)
- Humusrige jordtyper er ikke egnede p.g.a. risiko for opfrysning af udlægget



Renbestand eller med dæksæd?

Nedenstående viser de generelle anbefalinger om, hvorvidt der skal dæksæd med eller ej.

Såtidspunkt	Anbefales udlægget sået
1. – 15. aug.	i renbestand uden dæksæd
15. – 31. aug.	Ca. 30 kg vinterhvede pr. ha
Efter 1. sept.	Mere usikker mht. kløverens overvintring, rene græsblandinger kan fortsat sås

Dæksæden anvendes bl.a. for at beskytte udlægget mod vind og tidlig frost.

Vinterhvede som dæksæd har ikke påvirket foderværdien negativt i 1. og efterfølgende slæt, bl.a. fordi tendensen til gengroning ikke er så stor.



Merudbytte ved tidlig såning

De seneste år har der været gode erfaringer med etablering af kløvergræs i sensommeren – især ved tidlig såning. Resultater fra Landsforsøgene har vist, at der var hele 1.200 FE/ha mere at hente ved såning i renbestand i begyndelsen af august frem for såning en måned senere med dæksæd.

Frøblandinger

Man vil typisk vælge den samme frøblanding som ved såning om foråret, dvs. en blanding, der bl.a. passer til jordtype og foderplan. Dog bør frøblandinger med strandsvingel ikke udsås senere end 10. august, da den græsart har en lang etablerings-tid.

Vær også opmærksom på, at frøblandinger med meget lucerne (frøblanding nr. 48) etableres bedst ved en forårssåning.

Øvrigt

- Omhyggelighed ved såning af kløvergræsblandinger er også ved sommersåning meget påkrævet. Sådybden bør af hensyn til hvidkløver og andre småfrøede arter være ca. 1 cm. En god etablering af kløver har bl.a. stor betydning for græsmarkens ydeevne i flere år.
- Der er risiko for angreb af bladrandbiller på de små kløverplanter og for angreb af fritfluer på græsplanter i 1½-2 bladstadiet.
- Ved såning i begyndelsen af august kan græsset nå at vokse så meget, at en afpudsning inden vinter er nødvendig. Mængden vil ofte være for lille til at ensilere. Græsset må ikke være for langt inden vinteren - af hensyn til risiko for sneskimmel. Omvendt er en for sen og dyb afpudsning meget skadelig for græsmarkens evne til at klare vinteren. Afgræsning er også en mulighed, husk ingen dødbidning og optrådte marker.

